

Ridomil Gold® SL 2025

Fungicida sistemico specifico per trattamenti al substrato di coltivazione contro le Peronosporacee che colpiscono alberi e arbusti in vaso, piante ornamentali in vaso, fiori recisi, specie bulbose e da tubero.

Concentrato solubile
Metalaxyl-M - Codice FRAC 4

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

metalaxyl-m puro g 44 (465,2 g/L)

coformulanti q.b. a g 100

Contiene metalaxyl-m, acetophenone, heptan-2-one.



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H319 Provoca grave irritazione oculare. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P312 + P330 IN CASO DI INGESTIONE: In presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Sciacquare la bocca. P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A., Viale Fulvio Testi 280/6 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 18974 del 13.05.2025

Stabilimenti di produzione:

Chemark ZRT - Berhida, Peremarton Gyartelep (Ungheria)

Syngenta South Africa (Pty) Limited - Brits (Sud Africa)

Schirm USA Inc. - Ennis (USA)

Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio)

Syngenta Production France SAS - Aigues-Vives (Francia)

Stabilimenti di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I. - Enofyta (Grecia)

TORRE S.r.l. - Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Stabilimenti di rietichettatura:

ARCO Logistica S.r.l. - Via Monari, 5 Ferrara (FE)

ARCO Logistica S.r.l. - Via Battistella, 22 Ferrara (FE)

Sinteco Logistics S.p.A. - San Giuliano Milanese (MI)

Contenuto netto: mL 100 - 250 - 500; L 1 - 3 - 5 - 10

Partita n. vedi corpo della confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Metalaxil-m: sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

In caso di malessere, consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleeni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Caratteristiche

Ridomil Gold® SL 2025 è un fungicida sistemico per la difesa dalle malattie fungine dei generi *Pythium* e *Phytophthora*, agenti di marciumi radicali e del colletto su alberi e arbusti in vaso, piante ornamentali in vaso, fiori recisi, specie bulbose e da tubero. Il principio attivo penetra nelle radici delle piante trattate e viene trasportato e distribuito con la linfa nelle diverse parti della pianta. Dall'interno dei tessuti garantisce il contenimento degli attacchi dei funghi appartenenti agli Oomiceti, inibendo la crescita e la riproduzione del micelio. Il prodotto si impiega sulle colture e contro le malattie di seguito riportate in tabella.

Modalità d'impiego e dosi

Diluire il prodotto in una quantità di acqua sufficiente per una adeguata bagnatura/distribuzione al substrato di coltivazione.

Coltura in campo (non a contatto con il suolo) *	Patogeno	Modalità di applicazione	Dose di applicazione (L/ha)	Epoca di applicazione	Volume acqua (L/ha) **	Numero massimo di applicazioni per anno
Piante in vaso	<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp.	Subirrigazione - irrigazione a goccia	3,125 L/ha (applicazioni preventive) - 6,25 L/ha (applicazioni curative)	BBCH 12-91	1000 - 50000 L/ha	1
Alberi e arbusti in vaso	<i>Phytophthora</i> spp.	Subirrigazione - irrigazione a goccia	3,125 L/ha	BBCH 12-91	1000 - 50000 L/ha	2 (intervallo minimo tra le applicazioni: 14 giorni)
Piante in vaso	<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp.	Pre-trapianto (incorporazione nel terriccio) / applicazione automatizzata	6,25 L/ha	Marzo - Settembre	2500 - 5000 L/ha	1
Alberi e arbusti in vaso	<i>Phytophthora</i> spp.	Pre-trapianto (incorporazione nel terriccio) / applicazione automatizzata	6,25 L/ha	Marzo - Settembre	2500 - 5000 L/ha	1

*Includendo anche coltivazioni su pavimento impermeabile, su suolo coperto con materiale impermeabile e comunque in condizioni che prevedano la presenza di uno strato impermeabile tra la coltivazione e il suolo.

** Utilizzare un volume di bagnatura pari a circa il 10% del volume del vaso.

Coltura in serra e in ambiente chiuso (non a contatto con il suolo) *	Patogeno	Modalità di applicazione	Dose di applicazione (mL/m³)	Dose di applicazione (L/ha)	Epoca di applicazione	Volume acqua	Numero massimo di applicazioni per anno
Fiore reciso in serra su substrato artificiale	<i>Phytophthora cryptogea</i>	Irrigazione a goccia	-	0,125 L/ha	BBCH 13-69 (Gennaio - Dicembre)	1000 - 5000 L/ha	2 (intervallo minimo tra le applicazioni: 42 giorni)
Specie bulbose e da tubero in serra e in ambiente chiuso	<i>Pythium</i> spp.	Pre-trapianto (incorporazione nel terriccio) / applicazione automatizzata	2,5 mL/m³ ***	-	Gennaio - Dicembre	5-10 L/m³	1
Piante in vaso in serra e in ambiente chiuso per la preparazione dei substrati	<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp.	Pre-trapianto (incorporazione nel terriccio) / applicazione automatizzata	12,5 - 18,75 mL/m³ ****	-	Gennaio - Dicembre		1
Alberi e arbusti in vaso in serra e in ambiente chiuso per la preparazione dei substrati	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	Pre-trapianto (incorporazione nel terriccio) / applicazione automatizzata	12,5 mL/m³ *****	-	Febbraio - Ottobre		1

*Includendo anche coltivazioni su pavimento impermeabile, su suolo coperto con materiale impermeabile e comunque in condizioni che prevedano la presenza di uno strato impermeabile tra la coltivazione e il suolo.

*** Impiegare un volume di substrato trattato per ettaro che non superi l'apporto di 1,875 L/ha di prodotto.

**** Impiegare un volume di substrato trattato per ettaro che non superi l'apporto di 9,375 L/ha di prodotto.

***** Impiegare un volume di substrato trattato per ettaro che non superi l'apporto di 6,25 L/ha di prodotto.

Fitotossicità

Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi preliminari su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Compatibilità

Non è prevista la miscela con altri prodotti.

Strategia antiresistenza

Ridomil Gold® SL 2025 contiene metalaxyl-m, principio attivo appartenente al gruppo delle fenilammidi (codice FRAC 4). Per una corretta difesa fungicida, si raccomanda sempre di privilegiare l'impiego del prodotto mediante trattamenti preventivi seguendo le linee guida del FRAC per le fenilammidi.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.