



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'
ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)**

**E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari**

DECRETO

Modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **REVYSION SC** registrato al n. 17956 e dei prodotti identici **REVYSION** registrato al n. 18137 e **REYONA** registrato al n. 18138 a base della sostanza attiva *mefentrifluconazolo* dell'Impresa **BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l.**, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale con Italia in qualità di Stato membro interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione c/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute 21 novembre 2024 concernente " Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute ", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 in data 27 marzo 2023 dall'Impresa **BASF Italia SpA** con sede legale in Cesano Maderno, Via Marconato n. 8, finalizzata al rilascio della modifica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario **REVYSION SC** registrato al n. 17956 e dei prodotti identici **REVYSION** registrato al n. 18137 e **REYVONA** registrato al n. 18138 a base della sostanza attiva *mefentrifluconazolo*, nella quale l'impresa medesima ha indicato la Grecia quale Stato membro relatore ai sensi ai sensi dell'art. 33, comma 2b del citato regolamento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 337/2019 della Commissione del 27 febbraio 2019 recante approvazione della sostanza attiva *mefentrifluconazolo* fino al 20 marzo 2029, a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il rapporto di registrazione preliminare (*draft registration report-dRR*) valutato dalla Grecia in qualità di Stato membro relatore, ai sensi dell'art. 35 del citato Regolamento (CE) n. 1107/2009 e dalla stessa messo a disposizione degli altri Stati membri e dai commenti formulati dagli stessi ai sensi dell'art. 36, comma 1, del citato regolamento;

CONSIDERATO che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Grecia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (*registration report-RR*) messo a disposizione degli Stati membri;

VISTA la valutazione del rapporto di registrazione conclusivo (*registration report-RR*) da parte dello Stato membro Italia riportata nel *National assessment* con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

VISTA la nota dell' Ufficio in data 19 maggio 2026 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 5 giugno 2026 e successiva integrazione del 17 giugno 2026 con la quali l'Impresa ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo.

VISTO il decreto del 22 giugno 2026 con validità dal 1 luglio 2026 di trasferimento di titolarità dei prodotti fitosanitari da BASF Italia S.p.A. alla nuova ragione sociale BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l.

DECRETA

E' autorizzata ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009 la modifica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato **REVYSION SC** registrato al n. 17956 e dei prodotti identici **REVYSION** registrato al n. 18137 e **REYVONA** registrato al n. 18138 a base della sostanza attiva **mefentrifluconazolo** dell'Impresa **BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l.** con sede legale in Cesano Maderno (MB), in via Marconato n. 8, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La modifica dell'autorizzazione del prodotto in questione consiste nell'estensione a varie colture in campo e in serra.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il titolare dell'autorizzazione può rietichettare il prodotto non ancora posto in commercio e/o fornire ai rivenditori e/o distributori autorizzati un facsimile della nuova etichetta al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione denominata Trovanorme e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, li

04 SET. 2026

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Ugo DELLA MARTA



Estensore: dr.ssa Federica MICCHI UCCI

Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLLO

Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO



REVYSION® SC

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO

Sospensione concentrata (SC)

Meccanismo d'azione: Gruppo 3 (FRAC)

REVYSION® SC

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono

Mefentrifluconazolo g 7,12 (75 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

EUH208 Contiene miscela (3:1) di 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one.

Può provocare una reazione allergica

Contiene polimeri a base di idrossipoli(ossi-1,4-butandile) e 5-isocianato-1-(metilisocianato) e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P261 Evitare di respirare la nebbia o i vapori o gli aerosol. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE, lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Racogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenitore/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l. - Via Marconato 8
20511 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:

BASF Agricultural Solutions Spain SLU - La Canonja - Spagna

BASF Agri-Production S.A.S., Genay Cedex, Francia

Schirm GmbH Standort Schönebeck, Schoenebeck (Elbe), Germania

BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH - Ludwigshafen - Germania

STI Solfotecnica Italiana Spa, Cotignola (RA), Italia

BASF Agricultural Solutions US LLC - Sparks Plant - Sparks (GA) - USA

Officine di ri-etichettatura:

ITAFERT SRL - Canale (CN) - Italia

C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche - Cimadolmo (TV) - Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 17956 del 28.09.2022

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 - 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e caricamento del prodotto.

Non entrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lasciar trascorrere almeno 24 ore per il rientro. Qualora, i lavoratori rientrino nel campo dopo il trattamento, dovrebbero indossare pantaloni lunghi, maglietta e maniche lunghe e guanti.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Per proteggere gli organismi acquatici:

- Per le applicazioni precoci (fino allo stadio di bottoni fiorali) su pomacee e drupacee mantenere:

- una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali;
- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 75%;
- una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 90%;

- Per le applicazioni tardive (da inizio fioritura) su pomacee e drupacee mantenere:

- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali;
- una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 50%;

- Per AGRUMI e OLIVO mantenere:

- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali;



ATTENZIONE

- una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 50%;
- nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducano la deriva del 75%;
- Per KAKI e FRUTTA A GUSCIO mantenere:
- una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali;
- una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 50%;
- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 75%;
- nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducano la deriva del 90%.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REVYSION SC è un fungicida contenente la sostanza attiva mefentrifluconazolo, un innovativo triazolo che inibisce la biosintesi dell'ergosterolo, dotato di mobilità transaminare e sistemica e con attività preventiva e curativa. Il prodotto viene assorbito velocemente dalla pianta agendo rapidamente all'interno della stessa.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

Si consiglia di usare REVYSION SC nei periodi critici di sviluppo delle malattie sottoelencate, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'alternanza di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

Attenersi sempre alle linee guida FRAC per l'applicazione degli inibitori della biosintesi dell'ergosterolo.

Rispettare sempre per ciascuna coltura il numero massimo di trattamenti a stagione e l'intervallo tra le applicazioni sotto riportati.

Intervenire preventivamente in accordo agli stadi fenologici indicati per ciascuna coltura.

I volumi d'acqua utilizzati devono essere scelti, entro i limiti esposti per ciascuna coltura, in funzione dello stadio di sviluppo della coltura e del tipo di attrezzatura disponibile per l'applicazione in campo, rispettando le dosi massime per ettaro consentite.

Pomacee: utilizzare il prodotto da schiusura gemme fino a maturazione avanzata dei frutti. Contro ticchiolatura. Il prodotto va miscelato con altri formulati a differente meccanismo di azione ed è dotato di attività sia preventiva che curativa. Utilizzare volumi d'acqua pari a 200-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Drupacee: utilizzare il prodotto a partire dalla comparsa dei singoli bottoni fiorali fino alla completa maturazione dei frutti. Utilizzare volumi d'acqua pari a 200-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Olivo: utilizzare il prodotto dalla fase di emissione di nuove foglie fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 1000-1500 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Agrumi: utilizzare il prodotto a partire dall'inizio dell'allungamento dei germogli fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 1500-3000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Frutta a guscio: utilizzare il prodotto dalla fase di foglie distese fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 150-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Kaki: utilizzare il prodotto dalla comparsa dei bottoni fiorali fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 150-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Coltura	Malattia	Dose L/ha	N° tratti	Intervallo tra i tratti (gg)	PHI (gg)
Melo, Pero	Ticchiolatura (<i>Venturia</i> spp.) Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium</i>) e Atermanosi (<i>Alternaria</i> spp.)	1,8-2,0	2	7	28
Pasce e Nettare	Oidio (<i>Sphaerotheca</i> spp.), Moniliosi (<i>Monilinia</i> spp.), Bolla (<i>Taphrina deformans</i>) e Fusario (<i>Fusicoccum/Phomopsis amygdali</i>)	1,8	2	7	3
Susino e Ciliegio	Oidio (<i>Sphaerotheca</i> spp.) e Moniliosi (<i>Monilinia</i> spp.)	1,8	2	7	3
Albicocco	Oidio (<i>Sphaerotheca</i> spp.) Moniliosi (<i>Monilinia</i> spp.) e Maculatura rossa (<i>Apogonomyces erythrostomi</i>)	1,8	2	7	3
Olivo (olive da olio e da tavola)	Occhio di pavone (<i>Spilocaea oleagina</i>)	2	2	10	21

Cultura	Malattia	Dose L/ha	N° tratt.	Intervallo tra i tratt. (gg)	PHI (gg)
Agrumi e relativi ibridi (arancio imone, mandarini, clementine, mandarini secchi, tangerini, limacelle, pompelmo, perele, tangelo, etc.)	Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.), Microsfaralla (<i>Mycosphaerella citri</i>) Antracnosi (<i>Colletotrichum</i> spp.)	2	2	10	14
Kaki	Cercosporiosi (<i>Mycosphaerella nawae</i>)	2	2	7	28
Noci	Antracnosi (<i>Ophiognomonia leptostyla</i>) Necrosi apicale bruna (<i>Alternaria</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Colletotrichum</i> spp.)	2	2	7	28
Nocciuolo	Necrosi grigia (<i>Alternaria</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Cladosporium</i> spp.), Gleosporiosi (<i>Sphaeloma coryli</i>), Moniliosi (<i>Monilia</i> spp.), Oidio (<i>Phyllactinia corylea</i> , <i>Erysiphe coryleacearum</i>)	2	2	7	28
Castagno	Fersa (<i>Mycosphaerella maculiformis</i>), Marciume (<i>Gnomoniopsis castaneae</i>)	2	2	7	28
Mandorlo	Moniliosi (<i>Monilia</i> spp.), Corisco (<i>Sigatoma carpophila</i>), Antracnosi (<i>Colletotrichum acutatum</i>), Marcia rossa (<i>Polystigma amygdalinum</i>)	2	2	7	28
Pistacchio	Cancro (<i>Botryosphaeria dothidea</i>)	2	2	7	28

Sulle colture orticole e sulla fragola si può intervenire dalla fase dello sviluppo fogliare e su **asparago** dal momento di formazione dei fusti. Sospendere i trattamenti prima della raccolta rispettando l'intervallo di sicurezza indicato in relazione allo sviluppo vegetativo. Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura evitando lo sgocciolamento della vegetazione (mediamente 400-800 l/ha in pieno campo e 600-1200 l/ha in serra in funzione anche degli usi locali e delle attrezzature disponibili). Nel caso in cui, nelle prime fasi di sviluppo delle colture si dovesse ricorrere a trattamenti con volumi d'acqua inferiori ai 1000 l/ha, fare riferimento alle dosi ed ettolitro indicate in tabella, non scendendo comunque mai al di sotto del 70% della dose massima ad ettaro riportata per i diversi patogeni e le diverse colture. Successivamente, quando le colture cominciano ad essere più sviluppate, anche ricorrendo a volumi d'acqua inferiori ai 1000 l/ha, utilizzare sempre la dose massima riportata in etichetta.

Cultura	Malattia	Dose L/ha	Dose mL/ha	N° tratt.	Intervallo tra i tratt. (gg)	PHI (gg)
Patata (in pieno campo)	Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	1,25	125	3	7	3
Pomodoro e Melanzana (in pieno campo e in serra)	Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.), Oidio (<i>Leveillula</i> spp., <i>Oidium neolycopersici</i>)	1,5	150	3	7	3
Peperone (in serra)	Oidio (<i>Leveillula</i> spp., <i>Oidium neolycopersici</i>) Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	1,5	150	3	7	3
Zucchini, cetriolo e Cetriolino (in pieno campo e in serra)	Oidio (<i>Gaeulomyces archaeanum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>) Cancro gommoso (<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>), Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	1,5	150	3	7	1 (s) 3 (p.c.)
Zucca, melone e cocomero (in pieno campo e in serra)	Oidio (<i>Gaeulomyces archaeanum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>) Cancro gommoso (<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>), Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	1,5	150	3	7	3
Fragola (in serra, in walk-in tunnel e in pieno campo)	Oidio (<i>Podosphaera</i> spp., <i>Sphaerotheca maculans</i> , <i>Leveillula</i> spp.)	1,5	150	3	7	1
Cavoli a testa (cavoli, cappucci appuntiti, cavoli cappucci rossi, cavoli cappucci bianchi, verza), (in pieno campo)	Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.), Microsfaralla (<i>Neopseudocercospora brassicae</i>), Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)	1,5	150	3	10	7
Cavoli a infiorescenza (cavoli broccoli e cavolfiori) (in pieno campo)	Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.), Microsfaralla (<i>Neopseudocercospora brassicae</i>)	1,5	150	3	7	7

Cultura	Malattia	Dose L/ha	Dose mL/ha	N° tratt.	Intervallo tra i tratt. (gg)	PHI (gg)
	Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)					
Carciofo (in pieno campo)	Oidio (<i>Gaeulomyces archaeanum</i> , <i>Leveillula</i> spp.), Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	1,5	150	3	7	3
Asparago (in pieno campo)	Stemfiliosi (<i>Stemphylium vesicarium</i> , <i>S. botryosum</i>) Ruggine (<i>Puccinia asparagi</i>) Botrite (<i>Botrytis</i> spp.)	1,5	150	3	14	-
Colture baby leaf (bietole da foglie e da costa, lattughe, scarole/indivia e foglie larghe, senape indiana, spinaci e altre specie raccolte allo stadio di foglie giovani) (in pieno campo)	Cladosporiosi (<i>Cladosporium</i> spp.), Antracnosi (<i>Colletotrichum</i> spp.) Cercosporiosi (<i>Cercospora</i> spp.), Stemfiliosi (<i>Stemphylium</i> spp.)	1,5	150	1	-	3
Spinacio e Rucola (in pieno campo)	Cladosporiosi (<i>Cladosporium</i> spp.), Antracnosi (<i>Colletotrichum</i> spp.), Cercosporiosi (<i>Cercospora</i> spp.), Stemfiliosi (<i>Stemphylium</i> spp.), Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	1,5	150	1	-	3
Erbe fresche e fiori commestibili (cortogio, erba ciailina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, coriandolo, uva basilica e non commestibili: foglie di alloro-lauro, dragoncello, allin) (in pieno campo)	Cladosporiosi (<i>Cladosporium</i> spp.), Antracnosi (<i>Colletotrichum</i> spp.), Cercosporiosi (<i>Cercospora</i> spp.), Stemfiliosi (<i>Stemphylium</i> spp.)	1,5	150	1	-	3
Finochio, sedano, cardo, rebarbano (in pieno campo)	Septoriosi (<i>Septoria</i> spp.) Altermariosi (<i>Alternaria</i> spp.) Ramularia (<i>Ramularia</i> spp.) Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)	1,5	150	3	14	7

Culture leguminose: utilizzare il prodotto con volumi d'acqua pari a 100-400 L/ha, dalla fase di formazione delle infiorescenze fino alle fasi iniziali di sviluppo dei baccelli.

Mais: utilizzare il prodotto con volumi d'acqua pari a 100-400 L/ha, tra la fase di inizio levata (primo nodo del culmo visibile) e quella di fine fioritura.

Cultura	Malattia	Dose L/ha	N° tratt.	Intervallo tra i tratt. (gg)	PHI (gg)
Fagiolo, fava e favino da granella e per consumo fresco senza baccello (in pieno campo)	Antracnosi (<i>Ascochyta</i> spp., <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> , <i>Mycosphaerella pinodes</i>) Ruggine (<i>Uromyces</i> spp.), Botrite (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Botrytis fabae</i>)	0,8 - 1,3	2	10	-
Granello da granella e per consumo fresco senza baccello (in pieno campo)	Antracnosi (<i>Ascochyta</i> spp.), Ruggine (<i>Uromyces</i> spp.) Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,8 - 1,3	2	10	-
Lenticchia, pisa, lupino (in pieno campo)	Antracnosi (<i>Ascochyta</i> spp.)	0,8 - 1,3	2	10	-
Mais (da granella e da insilato)	Elmicosporiosi (<i>Setosphaeria turcica</i>) Fusariosi (<i>Fusarium</i> spp.)	1,25	1	-	-

Vite (da vino e da tavola): contro Oidio (*Erysiphe necator*) e Marciume nero (*Gignardia bidwellii*) intervenire preventivamente rispettando la dose massima di 1,3 litri per ettaro, indipendentemente dalla fase fenologica. Rispettare un massimo di 3 trattamenti a stagione e un intervallo tra le applicazioni di 10-14 giorni. Per un uso ottimale del prodotto si consiglia di modulare i dosaggi in funzione del periodo di applicazione e della forma di allevamento, seguendo le indicazioni riportate nella tabella sottostante.

Forme di allevamento	Periodo di applicazione	Dose consigliata L/ha
A spalliera (es. Guyot, cordone)	Prima della fioritura	0,7-1

aperonato, ecc.)	Da inizio fioritura in poi	1-1,3
Espanse (es: Tendone, Pergola, GDC, ecc.)	Prima della fioritura	1-1,3
	Da inizio fioritura in poi	1,3

In condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia si raccomanda di utilizzare gli intervalli più brevi e i dosaggi più alti. Utilizzare il prodotto con volumi d'acqua pari a 100-1200 L/ha.

REVYSION SC svolge un'azione collaterale nei confronti della Botrite (*Botrytis cinerea*) della vite (da vino e da tavola).

In alternativa al dosaggio per ettaro nel caso delle vite è possibile adattare la dose di prodotto in funzione della parete fogliare presente in campo al momento dell'applicazione.

Dose per parete fogliare: 1 L ogni 10 000 m² di parete fogliare (tLWA*). In ogni caso, non va mai superata la dose massima per ettaro di 1,3 L/ha e pertanto la dose per parete fogliare non va utilizzata se la tLWA è maggiore di 13.000 m².

*Calcolo della dose per parete fogliare (tLWA)

Procedere in 2 passaggi:

1. calcolo della parete fogliare presente al momento dell'applicazione (treated Leaf Wall Area = tLWA), utilizzando la seguente formula

$$tLWA (m^2/ha) = 2 \times \frac{\text{altezza della vegetazione da trattare (m)} \times 10.000 (m^2/ha)}{\text{distanza tra le file (m)}}$$

2. calcolo della dose da impiegare

La dose per ettaro da applicare una volta calcolato il tLWA è quindi

$$\text{Dose da impiegare (L/ha)} = \frac{tLWA (m^2/ha) \times \text{dose per parete fogliare (L/10.000 m}^2)}{10.000 (m^2/ha)}$$

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione aggiungere acqua fino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire bene l'attrezzatura con acqua.

Avvertenza - Durante le operazioni di miscelazione e canco utilizzare guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard.

FITOTOSSICITÀ

REVYSION SC, applicato secondo le indicazioni riportate in questa etichetta, non ha mai causato danni alle diverse cultivar saggiate fino ad oggi. Tuttavia, su varietà nuove e/o in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari su una piccola superficie, prima di estendere l'applicazione a tutto il campo.

Su vite, nelle fasi successive all'allegagione (da BBCH 71) si raccomanda di non applicare REVYSION SC in miscela con fungicidi contenenti dithianon.

COMPATIBILITÀ

REVYSION SC è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 1 giorno prima della raccolta di fragole e di zucchini, cetrioli e cetriolini in serra; 3 giorni prima della raccolta di pesche, nettarine, albicocche, susine, ciliegie, patate, zucchini, cetrioli e cetriolini in pieno campo, meloni, cocomeri e zucche, pomodori e melanzane in pieno campo e in serra, peperoni in serra, carciofi, spinaci, rucola, erbe fresche e fiori commestibili, prodotti baby leaf; 7 giorni prima della raccolta di cavoli, finocchi, sedani, cardi, rabarbaro; 14 giorni prima della raccolta di agrumi; 21 giorni prima della raccolta di uva e olive; 28 giorni prima della raccolta di mele, pere, kaki e frutta secca (noci, nocciole, mandorle, pistacchi e castagne).

ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo la norma vigente. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

REVYSION®

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO

Sospensione concentrata (SC)

Meccanismo d'azione: Gruppo 3 (FRAC)

REVYSION®

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Mefenflucanazolo g 7,12 (75 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

EUH208: Contiene miscela (3:1) di 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one.
Può provocare una reazione allergica.

Contiene: polimero a base di idrossipoli (poli-1,4-butadiene) e 5-iodonato-1-(metiliodonato) e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P201 Evitare di respirare la nebbia o i vapori o gli aerosol. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccolgere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenitore/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:

BASF Agricultural Solutions Spain SLU - La Canonja - Spagna
BASF Agri-Production S.A.S., Geney Cedex, Francia
Bchlm GmbH Standort Böhnebeck, Schoenebeck (Elbe), Germania
BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH - Ludwigshafen - Germania
STI Solfotecnica Italiana Spa, Codignola (RA), Italia
BASF Agricultural Solutions US LLC - Sparks Plant - Sparks (GA) - USA

Officine di ri-etichettatura:

ITAFERT SRL - Canale (CN) - Italia
C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche - Cinisello (TV) - Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. 18137 del 29/08/2022

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 - 10 litri

Partita n.

* Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Utilizzare l'abbigliamento da lavoro e guanti edati durante le operazioni di miscelazione e caricamento del prodotto.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lasciar trascorrere almeno 24 ore per il rientro. Qualora i lavoratori rientrino nel campo dopo il trattamento dovrebbero indossare pantaloni lunghi, maglietta e maniche lunghe e guanti.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

Per proteggere gli organismi acquatici:

- Per le applicazioni precoci (fino allo stadio di bottoni fiorali) su pomacee e drupacee mantenere:
 - una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali;
 - una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 75%;
 - una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 90%;
- Per le applicazioni tardive (da inizio fioritura) su pomacee e drupacee mantenere:
 - una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali;
 - una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 50%.

Per AGRUMI e OLIVO mantenere:

- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali;
 - una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 50%;
 - nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducano la deriva del 75%;
- Per KAKI e FRUTTA A GUSCIO mantenere:
- una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali;
 - una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 50%;
 - una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 75%;
 - nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducano la deriva del 90%.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE TECNICHE

REVYSION è un fungicida contenente la sostanza attiva mefenflucanazolo, un innovativo triazolo che imitica la biosintesi dell'ergosterolo, dotato di mobilità transaminare e sistemica e con attività preventiva e curativa. Il prodotto viene assorbito velocemente dalla pianta agendo rapidamente all'interno della stessa.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo spogliamento della vegetazione.

Si consiglia di usare REVYSION nei periodi critici di sviluppo delle malattie sottocollimate, nell'ambito di un programma di trattamento che preveda l'alberatura di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

Attenersi sempre alle linee guida FRAC per l'applicazione degli inibitori della biosintesi dell'ergosterolo.

Rispettare sempre per ciascuna coltura il numero massimo di trattamenti e stagione e l'intervallo tra le applicazioni sotto riportati. Intervenire preventivamente in accordo agli stadi fenologici indicati per ciascuna coltura.

I volumi d'acqua utilizzati devono essere scelti, entro i limiti esposti per ciascuna coltura, in funzione dello stadio di sviluppo della coltura e del tipo di attrezzatura disponibile per l'applicazione in campo, rispettando le dosi massime per ettaro consentite.

Pomacee: utilizzare il prodotto da chiusura gemme fino a maturazione avanzata dei frutti. Contro tichodieture il prodotto va miscelato con altri formulati a differente meccanismo di azione ed è dotato di attività sia preventiva che curativa. Utilizzare volumi d'acqua pari a 200-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Drupacee: utilizzare il prodotto a partire dalla comparsa dei singoli bottoni fiorali fino alla completa maturazione dei frutti. Utilizzare volumi d'acqua pari a 200-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Olivo: utilizzare il prodotto dalla fase di emissione di nuove foglie fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 1000-1500 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Agumi: utilizzare il prodotto a partire dall'inizio dell'allungamento dei germogli fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 1500-3000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Frutta a guscio: utilizzare il prodotto dalla fase di foglie distese fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 150-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Kaki: utilizzare il prodotto dalla comparsa dei bottoni fiorali fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 150-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Coltura	Malattia	Dose L/ha	N° tratt.	Intervallo tra i tratt. (gg)	PHI (gg)
Melo, Pero	Tichodieture (<i>Venturia</i> spp.), Olio (<i>Podosphaera leucotricha</i>), Maculature brune (<i>Sphaeria necrotoma</i>) e Alternarie (<i>Alternaria</i> spp.)	1,5-2,0	2	7	28
Pesce e Nettuno	Olio (<i>Sphaeria</i> spp.), Monilia (<i>Monilia</i> spp.), Bolla (<i>Taphrina deformans</i>) e Fusario (<i>Fusarium</i> spp.)	1,5	2	7	3
Suino e Cinghio	Olio (<i>Sphaeria</i> spp.) e Monilia (<i>Monilia</i> spp.)	1,5	2	7	3
Albicorno	Olio (<i>Sphaeria</i> spp.), Monilia (<i>Monilia</i> spp.) e Maculature rosse (<i>Agromyces erythroni</i>)	1,5	2	7	3
Olivo (olive da olio e da tavola)	Olio di piovra (<i>Sphaeria oleaginea</i>)	2	2	10	21

Forme di allevamento	Periodo di applicazione	Dose consigliata L/ha
A spalliera (es. Guyot, cordone speronato, ecc.)	Prima della fioritura	0,7-1
	Da inizio fioritura in poi	1-1,3
Espanse (es. Tendone, Pergola, GDC, ecc.)	Prima della fioritura	1-1,3
	Da inizio fioritura in poi	1-3

In condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, si raccomanda di utilizzare gli intervalli più brevi e i dosaggi più alti

REVYSION svolge un'azione collaterale nei confronti della Botrite (*Botrytis cinerea*) della vite (da vino e da tavola).

Vite da tavola: contro Oidio (*Erysiphe necator*) e Marcume nero (*Guignardia bidwellii*) intervenire preventivamente rispettando la dose massima di **1,3 litri per ettaro**, entro la fase di fine fioritura. Rispettare un massimo di 3 trattamenti a stagione e un intervallo tra le applicazioni di 10-14 giorni. Non applicare il prodotto dopo la fase di fine fioritura (BBCH 69).

In alternativa al dosaggio per ettaro nel caso delle vite è possibile adattare la dose di prodotto in funzione della parete fogliare presente in campo al momento dell'applicazione

Dose per parete fogliare: 1 L ogni 10.000 m² di parete fogliare (TLWA*). In ogni caso, non va mai superata la dose massima per ettaro di 1,3 L/ha e pertanto la dose per parete fogliare non va utilizzata se la TLWA è maggiore di 13.000 m².

*Calcolo della dose per parete fogliare (TLWA)

Procedere in 2 passaggi:

1. calcolo della parete fogliare presente al momento dell'applicazione (treated Leaf Wall Area = TLWA), utilizzando la seguente formula

$$TLWA (m^2/ha) = 2 \times \frac{\text{altezza della vegetazione da trattare (m)} \times 10.000 (m^2/ha)}{\text{distanza tra le file (m)}}$$

2. calcolo della dose da impiegare

La dose per ettaro da applicare una volta calcolato il TLWA è quindi

$$\text{Dose da impiegare (L/ha)} = \frac{TLWA (m^2/ha) \times \text{dose per parete fogliare (L/10.000 m}^2)}{10.000 (m^2/ha)}$$

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua fino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione e buona pratica pulire bene l'attrezzatura con acqua.

Avvertenza - Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare guanti e tuta standard, durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard

FITOTOSSICITÀ

REVYSION applicato secondo le indicazioni riportate in questa etichetta, non ha mai causato danni alle diverse cultivar saggiate fino ad oggi. Tuttavia su varietà nuove e/o in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari su una piccola superficie, prima di estendere l'applicazione a tutto il campo

Su vite, nelle fasi successive all'allegagione (da BBCH 71) si raccomanda di non applicare **REVYSION** in miscela con fungicidi contenenti diltanolo

COMPATIBILITÀ

REVYSION è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti: 1 giorno prima della raccolta di fragole e di zucchini, cetrioli e cetriolini in serra; 3 giorni prima della raccolta di pesche, nectarine, albicocche, susine, ciliegie, patate, zucchini, cetrioli e cetriolini in pieno campo, meloni, cocomeri e zucche, pomodori e melanzane in pieno campo e in serra, peperoni in serra, carciofi, spinaci, rucola, erbe fresche e fiori commestibili, prodotti baby leaf; 7 giorni prima della raccolta di cavoli, finocchi, sedani, cardi, rabarbaro; 14 giorni prima della raccolta di agrumi; 21 giorni prima della raccolta di uva e olive; 28 giorni prima della raccolta di mele, pere, kaki e frutta secca (noci, nocciole, mandorlo, pistacchi e castagne)

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli

eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non versarsi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

04 SET. 2026

REVYONA®

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO

Sospensione concentrata (SC)

Meccanismo d'azione. Gruppo 3 (FRAC)

REVYONA®

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono

Mefentrilconazolo g 7,12 (75 g/l)

Cotormulanti q. b. a g 100

EUH208 Contiene miscela (3:1) di 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one

Può provocare una reazione allergica

Contiene polimeri a base di idrossipoli (osai-1,4-butandile) e 5-isocianato-1-(metilisocianato) e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P261 Evitare di respirare la nebbia o i vapori o gli aerosol. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Racogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenitore/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l. - Via Marconato 8
20111 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/5121

Officine di produzione:

BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. - La Canónja - Spagna

BASF Agri-Production S.A.S. - Genay Cedex - Francia

Schilm GmbH Standort Schönebeck, Schönebeck (Elbe), Germania

BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH - Ludwigshafen - Germania

STI Solfotecnica Italiana SpA, Colognola (RA), Italia

BASF Agricultural Solutions US LLC - Sparks Plant - Sparks (GA) - USA

Officine di ri-etichettatura:

ITAFERT SRL - Canale (CN) - Italia

C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche - Cimadolmo (TV) - Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 12135 del 29/09/2022

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 - 10 litri

Partita n.

© Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Utilizzare l'uso/abbigliamento da lavoro e guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e caricamento del prodotto.

Non entrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lasciar trascorrere almeno 24 ore per il rientro. Qualora, i lavoratori entrino nel campo dopo il trattamento, dovrebbero indossare pantaloni lunghi, maglietta a maniche lunghe e guanti.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

Per proteggere gli organismi acquatici:

- Per le applicazioni precoci (fino allo stadio di bottoni fiorali) su

pomacee e drupacee mantenere:

- una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali,
- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 75%;
- una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 90%;

- Per le applicazioni tardive (da inizio fioritura) su **pomacee e drupacee** mantenere:

- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali,
- una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 50%;

- Per **AGRUMI e OLIVO** mantenere:

- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali,
- una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 50%;
- nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducano la deriva

del 75%;

- Per **KAKI e FRUTTA A GUSCIO** mantenere:

- una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali,
- una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 50%;
- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del 75%;
- nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducano la deriva del 90%.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REVYONA è un fungicida contenente la sostanza attiva mefentrilconazolo: un innovativo triazolo che inibisce la biosintesi dell'ergosterolo, dotato di mobilità transaminaria e sistemica e con attività preventiva e curativa. Il prodotto viene assorbito velocemente dalla pianta agendo rapidamente all'interno della stessa.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

Si consiglia di usare REVYONA nei periodi critici di sviluppo delle malattie sottocellulose, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'alternanza di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

Attenersi sempre alle linee guida FRAC per l'applicazione degli inibitori della biosintesi dell'ergosterolo.

Rispettare sempre per ciascuna coltura il numero massimo di trattamenti a stagione e l'intervallo tra le applicazioni sotto riportati.

Intervenire preventivamente in accordo agli stadi fenologici indicati per ciascuna coltura.

I volumi d'acqua utilizzati devono essere scelti, entro i limiti esposti per ciascuna coltura, in funzione dello stadio di sviluppo della coltura e del tipo di attrezzature disponibili per l'applicazione in campo, rispettando le dosi massime per ettaro consentite.

Pomacee: utilizzare il prodotto da schiusura gemme fino a maturazione avanzata dei frutti. Contro ticchiolatura il prodotto va miscelato con alta formulati a differente meccanismo d'azione ed è dotato di attività sia preventiva che curativa. Utilizzare volumi d'acqua pari a 200-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Drupacee: utilizzare il prodotto a partire dalla comparsa dei singoli bottoni fiorali fino alla completa maturazione dei frutti. Utilizzare volumi d'acqua pari a 200-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Olivo: utilizzare il prodotto dalla fase di emissione di nuove foglie fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 1000-1500 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Agrumi: utilizzare il prodotto a partire dall'inizio dell'allungamento dei germogli fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 1500-3000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Frutta a guscio: utilizzare il prodotto dalla fase di foglie distese fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 150-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Kaki: utilizzare il prodotto dalla comparsa dei bottoni fiorali fino all'intervallo di sicurezza (PHI) indicato in tabella. Utilizzare volumi d'acqua pari a 150-2000 L/ha, rispettando comunque la dose per ettaro indicata in tabella.

Coltura	Malattia	Dose L/ha	N° tratt.	Intervallo tra i tratt. (gg)	PHI (gg)
Melo, Pero	Ticchiolatura (<i>Venturia</i> spp.), Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>), Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium</i>) e <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i> spp.)	1,8-2,0	2	7	28
Peraio e Neraio	Oidio (<i>Sphaerotheca</i> spp.), Monilia (<i>Monilia</i> spp.), Botte (<i>Tapinoma deformans</i>) e Fusicoma (<i>Fusicoccum/Phymopsis amygdali</i>)	1,8	2	7	3
Susino e Cilegic	Oidio (<i>Sphaerotheca</i> spp.) e Monilia (<i>Monilia</i> spp.)	1,8	2	7	3
Albicorno	Oidio (<i>Sphaerotheca</i> spp.), Monilia (<i>Monilia</i> spp.) e Maculatura rossa (<i>Aspinromonia erythrostroma</i>)	1,8	2	7	3
Olivo (ovvero da olio e da tavola)	Cochio (<i>Spilocaea oleagina</i>)	2	2	10	11

gli intervalli più brevi e i dosaggi più alti

REYONA svolge un'azione collaterale nei confronti della Botrite (*Botrytis cinerea*) della vite (da vino e da tavola)

Vite da tavola: contro Oidio (*Erysiphe necator*) e Marciume nero (*Guignardia bidwellii*) intervenire preventivamente rispettando la dose massima di **1,3 litri per ettaro**, entro la fase di fine fioritura. Rispettare un massimo di 3 trattamenti a stagione e un intervallo tra le applicazioni di 10-14 giorni. Non applicare il prodotto dopo la fase di fine fioritura (BBCH 69).

In alternativa al dosaggio per ettaro nel caso delle vite è possibile adattare la dose di prodotto in funzione della parete fogliare presente in campo al momento dell'applicazione.

Dose per parete fogliare: 1 L ogni 10.000 m² di parete fogliare (tLWA*). In ogni caso, non va mai superata la dose massima per ettaro di 1,3 L/ha e pertanto la dose per parete fogliare non va utilizzata se la tLWA è maggiore di 13.000 m².

*Calcolo della dose per parete fogliare (tLWA)

Procedere in 2 passaggi:

1. calcolo della parete fogliare presente al momento dell'applicazione (treated Leaf Wall Area = tLWA), utilizzando la seguente formula

$$tLWA (m^2/ha) = 2 \times \frac{\text{altezza della vegetazione da trattare (m)} \times 10.000 (m^2/ha)}{\text{distanza tra le file (m)}}$$

2. calcolo della dose da impiegare

La dose per ettaro da applicare una volta calcolato il tLWA è quindi

$$\text{Dose da impiegare (L/ha)} = \frac{tLWA (m^2/ha) \times \text{dose per parete fogliare (L/10.000 m}^2)}{10.000 (m^2/ha)}$$

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione aggiungere acqua fino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire bene l'attrezzatura con acqua.

Avvertenza - Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare guanti e tuta standard durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard.

FITOTOSSICITÀ

REYONA, applicato secondo le indicazioni riportate in questa etichetta, non ha mai causato danni alle diverse cultivar saggiate fino ad oggi. Tuttavia, su varietà nuove e/o in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari su una piccola superficie, prima di estendere l'applicazione a tutto il campo.

Su vite, nelle fasi successive all'allegagione (da BBCH 71) si raccomanda di non applicare REYONA in miscela con fungicidi contenenti dithionon.

COMPATIBILITÀ

REYONA è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 1 giorno prima della raccolta di fragole e di zucchini, cetrioli e cetriolini in serra; 3 giorni prima della raccolta di pesche, nettarine, albicocche, susine, ciliegie, patate, zucchini, cetrioli e cetriolini in pieno campo, meloni, cocomeri e zucche, pomodori e melanzane in pieno campo e in serra, peperoni in serra, carciofi, spinaci, rucola, erbe fresche e fiori commestibili, prodotti baby leaf; 7 giorni prima della raccolta di cavoli, finocchi, sedani, cardi, rabarbaro; 14 giorni prima della raccolta di agrumi; 21 giorni prima della raccolta di uva e olive; 28 giorni prima della raccolta di mele, pere, kaki e frutta secca (noci, nocciole, mandorle, pistacchi e castagne).

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

04 SET. 2026