



We create chemistry

BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l., Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB), Italia

Cesano Maderno, 08 settembre 2026

Oggetto: p.f. **CONAXIS** (Reg. n. 19223 del 29.07.2026) – Decreto di autorizzazione nuovo prodotto

Gentilissima Dottoressa, Egregio Dottore,

la informiamo che con Decreto Dirigenziale datato 29 luglio 2026, abbiamo ottenuto la registrazione del nuovo prodotto fitosanitario **CONAXIS** (Reg. n. 19223), a base delle sostanze attive DIMETHENAMID-P e CLOMAZONE, quale **erbicida di pre-emergenza per il diserbo della soia**.

Il prodotto è stato registrato al numero 19223.

Sicuri di fare cosa gradita, alleghiamo il fac-simile della nuova etichetta.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potesse necessitare, la invitiamo a contattare direttamente il Tecnico di riferimento di zona.

Certi della Sua collaborazione, le inviamo i più cordiali saluti.

BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l.

Dr. Marco Pancaldi
Technical Market Development Manager Italia

Dr.ssa Stefania Meloni
Country Regulatory and PGA Manager Italia

Allegato fac-simile di etichetta p.f. CONAXIS (Etichetta autorizzata con DD del 29.07.2026)

BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l.

Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB), Italia
Telefono +39 0362 5121
info.agroitalia@basf.com
www.agro.basf.it

Società a socio unico

Sede legale
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB), Italia

Cap. Soc. Euro 1.000.000
Reg. Imp. 14178490968
R.E.A. MB - 2764998
Codice Fiscale 14178490968
Partita IVA 14178490968

CONAXIS®

ERBICIDA PER USO SU SOIA

SOSPENSIONE DI CAPSULE

Meccanismo d'azione: Gruppi 13 e 15 (HRAC)

CONAXIS®

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

DIMETHENAMID-P g 35,9 (400 g/L)

CLOMAZONE g 4,5 (50 g/L)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: 2-methyl-4-isothiazolin-3-one e 1,2-benzisothiazolin-3-one.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P311 In caso di irritazione o eruzione della pelle, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P330 Sciacquare la bocca. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

**BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF Agri-production S.A.S. – Gravelines – Francia

BASF Agricultural Solutions US LLC – Palmyra (MO) – USA

BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH – Ludwigshafen – Germania

BASF Agricultural Solutions Western Canada Inc. – Regina – Canada

IPT Pergande GmbH – Weißandt-Gölzau – Germania

SCHIRM GmbH – Standort Lübeck – Germania

SCHIRM GmbH – Schönebeck – Germania

TORRE s.r.l. – Torrenieri (SI) – Italia

Officine di rietichettatura:

ITAFERT SRL – Canale (CN) – Italia

C.D.M. S.r.l. – Soluzioni logistiche – Cimadolmo (TV) – Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. 19223 del 29.07.2026

Contenuto netto: 0,15 – 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 10 – 15 – 20 – 50 litri

Partita n.



ATTENZIONE

in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto vegetata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali; in alternativa, adottare misure di mitigazione che permettano la riduzione del ruscellamento del 60%.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** dalla zona non coltivata, in alternativa impiegare ugelli che abbattano la deriva del 75%.

Indossare guanti durante le fasi di applicazione, miscelazione e carico del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Consultare un centro antiveneni

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONAXIS® agisce sui semi delle infestanti in via di germinazione.

Infestanti sensibili:

Graminacee: Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Setaria (*Setaria spp.*).

Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Centocchio (*Stellaria media*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Senecione comune (*Senecio vulgaris*), Acalifa (*Acalypha virginica*).

Infestanti mediamente sensibili

Farinello (*Chenopodium spp.*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Aspraggine (*Picris spp.*).

EPOCA D'IMPIEGO

Eseguire un unico trattamento in pre-emergenza della soia, prima dell'emergenza delle infestanti sensibili.

DOSI D'IMPIEGO

CONAXIS® deve essere applicato alla dose di **1 - 1,25 L/ha**, diluito in volumi d'acqua di 100-400 L/ha.

Si consiglia di impiegare la dose più bassa per applicazioni su terreni limosi, sabbiosi e ricchi in scheletro.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- L'efficacia di CONAXIS® è favorita dall'umidità del terreno
- In caso di impiego su nuove varietà, si consiglia di controllare preventivamente la selettività con test su piccole superfici.
- Dopo un'applicazione primaverile di CONAXIS®, si consiglia di aspettare tre mesi dal trattamento ed eseguire una lavorazione superficiale del terreno prima della coltivazione di cereali vernini; aspettare quattro mesi ed effettuare una lavorazione/aratura del terreno profonda 15 centimetri prima della coltivazione di trifogli.
- In caso di fallimento di una coltura primaverile trattata con CONAXIS®: attendere 45 giorni ed effettuare una lavorazione profonda del terreno prima della semina di cereali o girasole; attendere 30 giorni ed effettuare una lavorazione del terreno a profondità moderata prima della semina di mais, sorgo, pisello, fagiolo o soia; eseguire una lavorazione del terreno profonda nel caso di semina di colza tre settimane dopo il trattamento. La semina di barbabietola da zucchero, trifoglio ed erba medica non è raccomandata.
- Non applicare il prodotto se sono previste forti piogge nei giorni successivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare direttamente il contenuto nella botte parzialmente riempita, mantenendo in funzione l'agitatore.

© Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione

FITOTOSSICITÀ

Non presenta fitotossicità nelle colture trattate alle dosi raccomandate fintanto che il suolo sia adeguatamente preparato, ben livellato e privo di zolle, venga seminato a una profondità di almeno 3 cm e si evitino le sovrapposizioni di trattamento.

COMPATIBILITÀ

CONAXIS® è risultato compatibile con i più diffusi prodotti erbicidi in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di resistenze applicare metodi alternativi di controllo delle infestanti (metodi meccanici, agronomici, ecc.) dove possibile e alternare l'uso di erbicidi aventi diverso meccanismo di azione.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29 luglio 2026