

VITENE® ULTRA SC**Fungicida in sospensione concentrata**

VITENE ULTRA SC – Composizione:

Cimoxanil g 20.83 (= 225 g/l)

Coformulanti e inerti q.b. a g 100

Contiene 1,2-Benzisothiazolinone

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

Nocivo se ingerito (H302). Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361Df). Può provocare danni al timo, alla circolazione sanguigna e agli occhi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol (P260). Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l'uso (P264). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti di protezione (P280). IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico (P301+P312). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente (P501).

SIPCAM ITALIA S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Tel. +39 02/353781

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13064 del 25.01.2011

Officine di produzione:

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Officina di confezionamento:

GLMA SRL – Via N. Bixio 6, 44042 Cento (FE)

Distribuito da:

ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100-250-500 Lt. 1-1,3-1,5-3-5-20

Partita n°

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Usare guanti durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Usare casco con visiera, guanti, tuta da lavoro stretta e stivali impermeabili durante l'applicazione.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Cimoxanil (derivato dell'urea). **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** nessuna.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleli.**CARATTERISTICHE**

Il prodotto è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro le diverse specie di peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

AVVERTENZE:

Viste le peculiari modalità d'azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotti di contatto registrati o in miscele complesse comprendenti Fosetil Al. Iniziare i trattamenti

preventivi o all'inizio del periodo infettivo e proseguire con cadenze dettate dalle molecole partners e dalla pressione della malattia. Il prodotto è selettivo anche durante la fioritura.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Per cipolla trattare fino alla fase di metà delle piante con foglie coricate e per carciofo trattare fino alla fase di raggiungimento del 50% della massa fogliare. Per la lattuga trattare fino al raggiungimento dell'80% della dimensione finale della testa.

Cultura		Dose di impiego		N. massimo di trattamenti
		ml/hl	ml/ha	
Vite da vino/ Vite da tavola	Campo	55-65	550-650	4
Pomodoro, Melanzana	Campo/Serra	55-65	550-650	5
Patata	Campo	55-65	550-650	5
Carciofo	Campo	60-100	600	3
Melone, Anguria, Zucca	Campo	60-100	600	4
Zucchini, Cetriolo	Campo/Serra	60-100	600	4
Lattuga e insalate	Campo	60-100	600-800	4
Spinaci, bietole da costa e da foglia	Campo	60-100	600-800	4
Basilico	Campo	60-100	600-800	4
Cipolla	Campo	100-150	600	4
Tabacco	Campo	65-90	500-540	2

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Per garantire una migliore efficacia del prodotto si consiglia di acidificare la soluzione tra valori di pH compresi tra 5 – 6.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico su colture non riportate in etichetta. In caso di miscele con altri agrofarmaci e/o fertilizzanti effettuare saggi preliminari al fine di valutarne la selettività.

Visto l'elevato numero di cultivars e il veloce rinnovo varietale, effettuare prove preliminari di selettività prima di intervenire su tutta la superficie coltivata.

Per lo spinacio non concentrare la soluzione irrorata in periodi freddi e/o con forti sbalzi termici fino alle 4-6 foglie vere della coltura.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare VITENE ULTRA SC ad altri fungicidi.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

Sospendere i trattamenti: 28 giorni prima della raccolta per vite; 14 giorni prima della raccolta per carciofo; 11 giorni prima della raccolta per melone, anguria, zucca; 10 giorni prima della raccolta per lattuga e insalate in campo, basilico, cipolla e per spinaci, bietole da costa e da foglia; 7 giorni prima della raccolta per tabacco e patata; 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchini.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

VITENE® ULTRA SC**Fungicida in sospensione concentrata**

VITENE ULTRA SC – Composizione:

Cimoxanil g 20.83 (=225g/lt)

Coformulanti e inerti q.b. a g 100

Contiene 1,2-Benzisothiazolinone

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

Nocivo se ingerito (H302). Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Può provocare danni al timo, alla circolazione sanguigna e agli occhi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol (P260). Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l'uso (P264). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti di protezione (P280). **IN CASO DI INGESTIONE:** in presenza di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico (P301+P312). **IN CASO** di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente (P501).

SIPCAM ITALIA S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Tel. +39 02/353781

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13064 del 25.01.2011

Officine di produzione:

SIPCAM OXON S.p.A.-Salerano sul Lambro (LO)

Officina di confezionamento:

GLMA SRL – Via N. Bixio 6, 44042 Cento (FE)

Distribuito da:

ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100

Partita n.:.....

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Usare guanti durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Usare casco con visiera, guanti, tuta da lavoro stretta e stivali impermeabili durante l'applicazione.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Cimoxanil (derivato dell'urea). **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** nessuna.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleli.**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.****SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.****IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**