

Cesano Maderno, 25 marzo 2026

Oggetto: Autorizzazione eccezionale del p.f. **EFFICON ORANGE** (Reg. n. 19286) su agrumi (arancio, mandarino e clementino)

Gentilissima Dottoressa, Egregio Dottore,

la informiamo che con Decreto del 20 marzo 2026, notificato il 24 marzo, abbiamo ottenuto l'autorizzazione di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto **EFFICON ORANGE** (Reg. n. 19286), a base della sostanza attiva Dimpropyridaz, quale insetticida **per il controllo della Cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*) per arancio, mandarino e clementino.**

Il prodotto è pertanto autorizzato per l'impiego su arancio, mandarino e clementino **dal 15 aprile 2026 al 12 agosto 2026.**

Sicuri di fare cosa gradita, alleghiamo il fac-simile della nuova etichetta.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potesse necessitare, la invitiamo a contattare direttamente il Tecnico di riferimento di zona.

Certi della Sua collaborazione, le inviamo i più cordiali saluti.

BASF Italia S.p.A.
Agricultural Solutions



Dr. Marco Pancaldi
Technical Market Development Manager Italia



Dr.ssa Stefania Meloni
Country Regulatory and PGA Manager Italia

Allegato fac-simile di etichetta p.f. EFFICON ORANGE (DD del 20.03.2026 – Autorizzazione eccezionale su agrumi dal 15.04.2026 al 12.08.2026).

EFFICON® ORANGE

INSETTICIDA

LIQUIDO SOLUBILE (SL)

Meccanismo d'azione: Gruppo 36 (IRAC)

EFFICON® ORANGE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
DIMPROPYRIDAZ puro g 10,79 (=120 g/l)
Coformulanti inerti q.b. a g 100

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 19286 del 20/03/2026

Officine di produzione

BASF Agri-Production S.A.S. - Genay Cedex, Francia

Officine di rietichettatura:

ITAFERT SRL – Canale (CN), Italia

C.D.M. S.r.l. – Soluzioni logistiche, Cimadolmo - Treviso

Contenuto netto: 0,25 L – 1L

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Non utilizzare in presenza di api o altri impollinatori in attività. Asportare l'eventuale vegetazione spontanea in fioritura.

INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica e di supporto.

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE: EFFICON ORANGE è un prodotto insetticida sistemico con movimento acropeto nello xilema e translaminare nelle foglie per la protezione di arancio e mandarino (incluso clementino) da usarsi per il controllo della cocciniglia rossa forte degli agrumi.

La modalità d'azione per ingestione e contatto lo rende estremamente efficace contro gli insetti bersaglio dotati di apparato boccale pungente-succhiante, i quali subito dopo il trattamento con EFFICON ORANGE cessano di nutrirsi in seguito alla perdita di coordinazione motoria per poi morire di fame.

Dimpropridaz, l'innovativo principio attivo di EFFICON ORANGE, è incluso come unico esponente nel nuovo gruppo 36 dell'IRAC, come modulatore degli organi cordotonali.

USI, MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO:

EFFICON ORANGE deve essere applicato con applicazioni fogliari secondo le modalità indicate nella tabella seguente.

Coltura	Parassita	Dose L/ha	N° tratt. (max)	Intervallo minimo tra i trattam. (gg)
Arancio, Mandarino e Clementino	Cocciniglia rossa forte degli agrumi (<i>Aonidiella aurantii</i>)	0.9	2	7

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione, in funzione dello stadio di sviluppo della coltura e del tipo di attrezzatura disponibile per l'applicazione in campo, rispettando sempre le dosi massime per ettaro consentite.

Intervenire in accordo ai seguenti stadi fenologici:

- su **arancio, mandarino, clementino** trattare in pre-fioritura (dall'inizio della crescita dei germogli fino alla comparsa dei fiori ancora chiusi) e/o in post-fioritura durante lo sviluppo dei frutti fino al raggiungimento di una dimensione di circa 30 mm (non applicare dopo BBCH 73); **in alternativa**, un trattamento in post fioritura, durante lo sviluppo dei frutti fino al raggiungimento di una dimensione di circa 70 mm (non applicare dopo BBCH 77).

GESTIONE DELLE RESISTENZE

A causa del potenziale sviluppo di fenomeni di resistenza agli insetticidi, è fondamentale attenersi strettamente ai suggerimenti dell'IRAC. A questo scopo, si raccomanda di:

- alternare insetticidi dotati di differenti meccanismi d'azione durante il ciclo colturale;
- applicare il dosaggio d'etichetta raccomandato nel momento appropriato, così da assicurare un controllo completo del fitofago;
- mettere in atto le buone pratiche applicative allo scopo di massimizzare l'attività del prodotto: applicazioni inadeguate potrebbero infatti permettere agli insetti sopravvissuti di ricostituire nuove popolazioni del fitofago, che metterebbero sempre più sotto pressione il prodotto, il quale potrebbe quindi andare incontro a futuri problemi di efficacia;
- monitorare le popolazioni dei fitofagi nelle zone-chiave allo scopo di rilevare in esse cambiamenti significativi in termini di sensibilità al prodotto;
- in caso di dubbi, contattare i distributori o i consulenti esperti locali relativamente alla gestione delle resistenze agli insetticidi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Stemperare, mediante agitazione, la giusta dose di prodotto in metà acqua rispetto alla quantità necessaria per ottenere la concentrazione voluta; quindi, sempre continuando ad agitare, aggiungere la rimanenza fino a volume completo ed iniziare il trattamento.

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: EFFICON ORANGE ha dimostrato di essere selettivo sulle colture raccomandate quando l'uso avviene secondo le istruzioni della presente etichetta. Nel caso di impiego su varietà di recente costituzione, la buona pratica agricola comunque consiglia di effettuare un saggio preliminare la prima volta che viene usato un prodotto nuovo, trattando poche piante ed accertandosi che nelle condizioni specifiche non si verifichino inconvenienti.

Sospendere i trattamenti facendo riferimento alle fasi fenologiche indicate nella sezione "USI, MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO".

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni

per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20/03/2026

Con validità dal 15/04/2026 al 12/08/2026