

**SCHEDA DI TRATTAMENTO DELL'OSTEOPOROSI
CON AC. ALENDRONICO, AC. RISEDRONICO, AC. IBANDRONICO, AC. ALENDRONICO
+VITAMINA D3, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE, RANELATO DI STRONZIO.
(Nota AIFA 79)
Regione Molise**

| | | |
|--|---|----------------------|
| Paziente | | |
| Cognome _____ | Nome _____ | |
| Data di nascita ___/___/___ | Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | Codice Fiscale _____ |
| ASL di appartenenza dell'assistito _____ | Provincia _____ | Regione _____ |

| |
|---|
| Centro / Medico Specialista Prescrittore |
| <p>La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni di rischio:</p> <p><input type="checkbox"/> soggetti di età superiore a 50 anni in cui sia previsto un trattamento > 3 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi</p> <p>ac. alendronico, ac. risedronico, ac. alendronico + vitamina D3.</p> <p><input type="checkbox"/> soggetti con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o di femore</p> <p><input type="checkbox"/> soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T-score della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno < - 4 (o < -5 per ultrasuoni falangi) (*)</p> <p><input type="checkbox"/> soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T-score della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno < -3 (o < - 4 per ultrasuoni falangi) (*) e con almeno uno dei seguenti fattori di rischio aggiuntivi</p> <p><input type="radio"/> storia familiare di fratture vertebrali</p> <p><input type="radio"/> artrite reumatoide e altre connettiviti</p> <p><input type="radio"/> pregressa frattura osteoporotica al polso</p> <p><input type="radio"/> menopausa prima 45 anni di età</p> <p><input type="radio"/> terapia cortisonica cronica</p> <p>ac. alendronico, ac. alendronico + vitamina D3, ac. risedronico, ac. ibandronico, raloxifene, bazedoxifene, ranelato di stronzio.</p> <p>Prima di avviare la terapia con i farmaci sopraindicati, in tutte le indicazioni è raccomandato un adeguato apporto di calcio e vitamina D, ricorrendo, ove dieta ed esposizione solari siano inadeguati, a supplementi con sali di calcio e vitamina D3 (e non ai suoi metaboliti idrossilati). La prevenzione delle fratture osteoporotiche deve anche prevedere un adeguato esercizio fisico, la sospensione del fumo e la eliminazione di condizioni ambientali ed individuali favorenti i traumi. Non deve essere dimenticato, infine, che tutti principi attivi non sono privi di effetti collaterali per cui va attentamente valutato il rapporto vantaggi e rischi terapeutici. Inoltre la loro associazione è potenzialmente pericolosa e va pertanto evitata. Per l' applicazione della Nota 79 (*) la valutazione della massa ossea con tecnica DXA o ad ultrasuoni deve essere fatta presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN.</p> |

| | |
|---|---|
| FARMACO PRESCRITTO _____ | DURATA DEL TRATTAMENTO _____ |
| Prima prescrizione <input type="checkbox"/> | Proseguimento cura <input type="checkbox"/> |
| Timbro e firma del Medico Prescrittore | |
| Data _____ | _____ |